


Les Recos VIDAL décrivent la stratégie thérapeutique pour la prise en charge de plus de 175 pathologies représentant les situations médicales les plus fréquentes.

Elles sont rédigées sur la base des recommandations publiées par la HAS, l'ANSM et des sociétés savantes françaises et internationales.

Les arbres décisionnels donnent, en une image, l'essentiel de la démarche thérapeutique décrite dans les

textes officiels et, pour chaque traitement cité, la liste des médicaments correspondants avec, en lien, les fiches produits correspondantes.

- 1 Pour accéder aux Recos, cliquez sur le lien « VIDAL Recos » situé à gauche de la barre de navigation ou sur l'icône « Accéder à VIDAL Recos » de la page d'accueil.



- 2 Visualisez la liste des Recos disponibles par domaine thérapeutique ou par ordre alphabétique : plus de 175 pathologies et situations médicales.
- 3 Explorez l'arborescence en cliquant sur les cases \oplus/\ominus , puis cliquez sur une Reco pour l'afficher.
- 4 Cliquez sur les titres de chapitre pour consulter la Reco sélectionnée.

Sommaire

Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte

- ▶ La maladie
- ▶ Diagnostic
- ▶ Quels patients traiter ?
- ▶ Objectifs de la prise en charge
- ▶ **Prise en charge** (4)
- Arbres décisionnels
- Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte
- PAC : prise en charge hospitalière
- PAC en contexte grippal
- Cas particuliers
- Suivi et adaptation du traitement
- Conseils aux patients
- ▶ Traitements
- Médicaments cités dans les références
- Médicaments non cités dans les références
- ▶ Références

Prise en charge

Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte

Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte

1 Recherche de signes de gravité ou situation particulière

Absence de signes de gravité

2 Recherche de facteurs de risque de mortalité

3 Âge < 65 ans sans ou avec 1 seul facteur de risque ou âge ≥ 65 ans sans facteur de risque ou score CRB 65 = 0

4 Prise en charge généralement ambulatoire

5 Antibiothérapie probabiliste per os amoxicilline ou en cas de doute entre *S. pneumoniae* et germes atypiques : pristinamycine ou télichromycine

Après 48 à 72 heures, réévaluation

Amélioration clinique

Persistence ou aggravation des signes

Signes de gravité ou situation particulière

Liens vers tous les traitements disponibles : listes exhaustives des médicaments (avec liens directs vers fiches produits médicaments), et traitements non médicamenteux.

Remarque :

On peut rechercher directement une Reco par mot-clé (cf. Fiche n° 2 : Principes généraux de la recherche).

On peut accéder directement à une Reco à partir d'une fiche produit (cf. Fiche n° 4 : Lire une fiche produit médicament).